



MELANZANA



Indicazioni tecniche, prodotti per la difesa e di supporto

AVVERSITÀ	Prodotti consigliati	Epoca e utilità di impiego
ERBE INFESTANTI		
Infestanti annuali e perenni, mono e dicotiledoni	ERBICIDA PREMIUM GREEN	Applicare NON in presenza della coltura
CRITTOGAME		
Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	SANDEK + PROPOLI A + PROPOLI B	Creazione di un ambiente sfavorevole agli agenti di marciume
Tracheovorticiliosi (<i>Verticillium spp.</i>), <i>Rizotonia</i> Marciume radicali (<i>Pythium spp.</i>), <i>Phytophthora capsici</i>	XEDAVIR	Applicare preventivamente alla semina/trapianto
Tracheomicosi (<i>Fusarium Oxysporum</i>)	IF23	Creazione di un ambiente sfavorevole a <i>Fusarium oxysporum</i>
BATTERIOSI		
<i>Xanthomonas spp.</i> , <i>Pseudomonas spp.</i>	OSSICLOR 20 FLOW	Al verificarsi di condizioni favorevoli alla malattia Non superare il quantitativo di 4 kg di s.a./ha/anno
FITOFAGI		
Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	BOTANIGARD SE	Intervenire ad inizio infestazione e dopo 6-7 gg
Afidi (<i>Myzus persicae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Aphis gossypii</i>)	ESTEL + Olio di Soia K60	
Nottue fogliari (<i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Autographa gamma</i>), <i>Tuta absoluta</i>	BTK32 WG	Applicare alla prima comparsa delle larve
Tripidi (<i>Thrips spp.</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>) Aleurodidi (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia Tabaci</i>)	BOTANIGARD SE EKO OIL S	Intervenire ad inizio infestazione e dopo 6-7 gg
Nematodi galligeni (<i>Meloidogyne spp.</i>)	ABT-EU04	Al verificarsi di condizioni favorevoli ai nematodi

Legenda. **In verde: prodotti fitosanitari.**

Il posizionamento dei prodotti è da considerarsi indicativo e soggetto a modifiche in funzione delle realtà locali. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nelle etichette ministeriali.

