



ZUCCA



Indicazioni tecniche, prodotti per la difesa e di supporto

AVVERSITÀ	Prodotti consigliati	Epoca e utilità di impiego
ERBE INFESTANTI		
Infestanti annuali e perenni, mono e dicotiledoni	ERBICIDA PREMIUM GREEN	Applicare NON in presenza della coltura
CRITTOGAME		
Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	OSSICLOR 20 FLOW	Al verificarsi di condizioni favorevoli alla malattia Non superare il quantitativo di 4 kg di s.a./ha/anno
Marciumi radicali (<i>Pythium spp.</i>)	XEDAVIR	Applicare preventivamente alla semina/trapianto
BATTERIOSI		
<i>Pseudomonas syringae</i> <i>Erwinia carotovora</i>	OSSICLOR 20 FLOW	Al verificarsi di condizioni favorevoli alla malattia Non superare il quantitativo di 4 kg di s.a./ha/anno
FITOFAGI		
Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	BOTANIGARD SE	Intervenire ad inizio infestazione e dopo 6-7 gg
Nottue fogliari (<i>Helicoverpa armigera</i>)	BTK32 WG	Applicare alla prima comparsa delle larve
Aleurodidi (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>)	BOTANIGARD SE ESTEL + Olio di Soia K60	Intervenire ad inizio infestazione e dopo 6-7 gg
Tripidi (<i>Thrips spp.</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>) Aleurodidi (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia Tabaci</i>)	BOTANIGARD SE	Intervenire ad inizio infestazione e dopo 6-7 gg
Nematodi galligeni (<i>Meloidogyne spp.</i>)	ABT-EU04	Al verificarsi di condizioni favorevoli ai nematodi

Legenda. **In verde: prodotti fitosanitari.**

Il posizionamento dei prodotti è da considerarsi indicativo e soggetto a modifiche in funzione delle realtà locali. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nelle etichette ministeriali.

