



# Rain Gard

Antispacco - Protettivo



 XEDA ITALIA s.r.l.

## RAINGARD

Antispacco-protettivo

### COMPOSIZIONE

Acidi grassi di origine vegetale, acqua

### CARATTERISTICHE

I fattori che favoriscono le lesioni da spacco (cracking) dipendono dal periodo fenologico e dalle condizioni ambientali: la maggior sensibilità allo spacco si verifica infatti nel periodo che va dall'invasatura alla maturazione del frutto, soprattutto in concomitanza con un'elevata umidità atmosferica e/o piogge medio-intense. In ogni caso, la lesione definitiva viene causata da un aumento del turgore cellulare e conseguente incremento del volume della polpa del frutto.

RAINGARD consente di prevenire e limitare i danni da spacco grazie ad una duplice azione.

- riduzione della formazione delle tipiche micro-lesioni sulla cuticola dei frutti ed aumento dell'elasticità dei tessuti (soprattutto nella fase di rapido accrescimento).
- formazione di uno strato protettivo idrofobico sulla cuticola che ostacola la penetrazione dell'acqua dall'esterno, senza interferire con i normali processi respiratori e fotosintetici.

### AVVERTENZE

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 35°C. Il prodotto non è combustibile. Il contenitore completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Le raccomandazioni e le informazioni fornite sono frutto di ampi e rigorosi studi e test. Tuttavia, durante l'utilizzazione possono intervenire numerosi fattori che sfuggono al nostro controllo (preparazione della poltiglia, applicazione, condizioni meteorologiche, ecc.). L'azienda garantisce la composizione, la formulazione e il contenuto.

L'utilizzatore sarà responsabile di eventuali danni causati (mancanza di efficacia, tossicità in generale, etc.) per inosservanza totale o parziale delle istruzioni riportate sull'etichetta.

### DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

COLTURE	DOSE	APPLICAZIONI
Ciliegio	0,8 lt/100 lt di acqua 5-8 lt/ha	1° al viraggio del colore del frutto 2° 7-10 giorni dopo la prima 3° 7-10 giorni dopo la seconda (eventuale ed in funzione delle condizioni ambientali)

Impiegare un volume di acqua di almeno 800-1.000 litri/ha. È consigliabile anticipare il trattamento in previsione di piogge. Il prodotto può essere applicato fino a 5 ore prima della pioggia.

Non è un fertilizzante. Non è un fitofarmaco.  
AGITARE BENE PRIMA DELL'USO

Prodotto da:

 Pace International  
5661 Branch Road - Wapato, WA 98951 U.S.A.

Distribuito da:

XEDA ITALIA S.r.l.  
Via F. Guarini, 13 - 47121 Forlì (FC)  
www.xeda.it - info@xeda.it

Lotto N.

Scadenza:

**CONTENUTO NETTO: Lt. 5**