

EkoOil S

Insetticida-acaricida a base di olio di paraffina
Emulsione Olio/Acqua

EkoOil S - Registrazione Ministero della Salute n° 17224 del 28/05/2018

Composizione:

g 100 di prodotto contengono:
Olio di paraffina g 60,4 (=546 g/L)
(CAS n. 8042-47-5)
Coformulanti q.b. a g 100

Partita n°

W. Neudorff GmbH KG

An der Mühle 3
31860 Emmerthal (Germania)
Tel. +49 (0)51 55/624-0

Stabilimento di produzione:

W. Neudorff GmbH KG - Emmerthal (Germania)

Distribuito da:

KOLLANT S.r.l. - Via C. Colombo, 7/7A - 30030
Vigonovo (VE) - Tel. 049 9983000

Xeda Italia Srl

Via Filippo Guarini, 13, 47100 Forlì (FC) - Tel. 0543 780600

Contenuto netto: Litri 0,25-0,5-1-5-10-20-25-30-200*

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P273 Non disperdere nell'ambiente.

REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata:

- di 10 metri da corpi idrici superficiali nelle applicazioni su agrumi, olivo e nelle applicazioni tardive su pomacee e drupacee

- di 20 metri da corpi idrici superficiali nelle applicazioni precoci su pomacee e drupacee.

INFORMAZIONI MEDICHE:

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.



ATTENZIONE

CARATTERISTICHE

EkoOil S è un olio di paraffina ad attività insetticida ed acaricida ad alto grado di raffinazione per la lotta invernale e primaverile-estiva contro le cocciniglie degli agrumi e dell'olivo, gli afidi del pesco e del susino, gli acari e gli afidi del melo, la psilla del pero e la mosca bianca e i tripidi delle colture orticole.

DOSI D'IMPIEGO

MELO contro **Acari**: Raghetto rosso (*Panonychus ulmi*) 1 litro/hl (4,5-12 L/ha) distribuito con volumi d'acqua di 450-1200 litri/ha. È possibile intervenire sia dalla fase di "orecchiette di topo" alla caduta petali, sia da inizio sviluppo frutti fino in prossimità della raccolta, sia alla caduta foglie, effettuando massimo 2 trattamenti/anno a una distanza di 6-15 giorni.

MELO e PERO contro **Afidi**: Afide grigio (*Disaphis plantaginea*), Afide verde (*Aphis pomi*): 1 litro/hl (4,5-12 L/ha) distribuito con volumi d'acqua di 450-1200 litri/ha. È possibile intervenire sia dalla fase di "orecchiette di topo" alla caduta petali, sia da inizio sviluppo frutti fino in prossimità della raccolta, sia alla caduta foglie, effettuando massimo 2 trattamenti/anno a una distanza di 6-15 giorni.

MELO e PERO contro **Psille**: Psilla del pero (*Cacopsylla pyri*), Psille del melo (*Cacopsylla melanoneura*, *Cacopsylla costalis*, *Cacopsylla mali*, *Cacopsylla pruni*): 1 litro/hl (4,5-12 L/ha) distribuito con volumi d'acqua di 450-1200 litri/ha. È possibile intervenire sia dalla ripresa vegetativa fino a "foglie completamente distese", sia ad "ingrossamento gemme/bottoni verdi", sia da inizio sviluppo frutti a frutti di dimensioni pari al 50% delle dimensioni finali, effettuando massimo 2 trattamenti/anno a una distanza di 7-15 giorni

DRUPACEE (pesco, nettarine, susino, albicocco, ciliegio): contro **Afidi**: Afide verde (*Myzus persicae*), Afide farinoso (*Hyalopterus amygdali*), Afide del ciliegio (*Myzus cerasi*): 1 litro/hl (4,5-12 L/ha) distribuito con volumi d'acqua di 450-1200 litri/ha. Intervenire dalla fase "calici visibili" a "fine caduta petali" o alla caduta foglie, effettuando massimo 2 trattamenti/anno a una distanza di 7-15 giorni.

AGRUMI: contro le **Cocciniglie**: Cocciniglia rossa forte (*Aonidiella aurantii*): 1-2 litri/hl (5-30 L/ha) distribuito con volumi d'acqua di 500-1500 litri/ha. Intervenire da fine fioritura a prima dell'invaiaura, effettuando massimo 2 trattamenti/anno a una distanza non inferiore a 60 giorni.

OLIVO: contro le **Cocciniglie**: Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*): 2 litri/hl (6-15 L/ha) distribuito con volumi d'acqua di 300-750 litri/ha. Intervenire da caduta petali a prima dell'invaiaura, effettuando massimo 1 trattamento/anno.

CAVOLFIORI, CAVOLI BROCCOLI contro Mosca Bianca (*Aleyrodes proletella*): 1-2 litri/hl (3-20 L/ha) distribuito con volumi d'acqua di 300-1000 litri/ha. Intervenire al primo apparire dei parassiti, effettuando massimo 2 trattamenti/anno a una distanza di 60 giorni.

CETRIOLO, MELONE, ZUCCHINO, PEPERONE, POMODORO, MELANZANA: (uso in serra) contro Mosca Bianca (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*) e tripidi (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips spp.*): 1 litro/hl (3-12 L/ha) distribuito con volumi d'acqua di 300-1200 litri/ha. Intervenire al primo apparire dei parassiti, effettuando massimo 2 trattamenti/anno a una distanza di 7-15 giorni. (Con l'introduzione in serra di insetti utili l'intervallo di applicazione non deve essere inferiore a 60 giorni).

MODALITÀ D'IMPIEGO

Versare la dose prevista nel serbatoio dell'irroratrice parzialmente riempito d'acqua e agitare a fondo, quindi aggiungere altra acqua fino al volume desiderato. Mantenere in continua agitazione anche in fase di applicazione.

COMPATIBILITÀ

EkoOil S si impiega da solo.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

- Evitare di trattare piante sotto stress, in periodi di forte siccità, eccessiva umidità e in periodi di gelo.
- Non applicare il prodotto quando la temperatura supera i 32°C o durante il periodo di fioritura in quanto potrebbero verificarsi problemi di fitotossicità.
- Non applicare il prodotto 40 giorni prima o dopo l'applicazione di polisolfuri o zolfo.

ATTENZIONE:

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE
O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

*Attenzione: contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo. Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zone di bacino di contenimento di adeguato volume, atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto

** Non applicabile per le confezioni da 200 L