

CEREALI E OLEAGINOSE

STRATEGIA FOGLIARE RADICALE

AVVERSITÀ O PROBLEMATICHE	Fasi del ciclo colturale						Tipo di Applica- zione
	Pre- Trapianto	Trapianto	Formazione Germogli	Fioritura	Sviluppo Frutti	Maturazione	
FITOFAGI	Nottue		BTK 32 WG (1 kg/ha)				
	Afidi		BIOVIS (160 ml/hl) + OLIO DI SOIA (200 ml/hl)				
	Insetti Terricoli		METAX* (3 L/ha)				
	Mosca Bianca, Afidi, Tripidi, Acari		XEDAROS* (0,6 - 1 L/hl)				
	Afidi, Aleurodidi, Dorifora, Minatori, Nottue, Tripidi		XEDOIL* (3 L/ha)				
	Afidi, Aleurodidi, Acari, Tripidi, Cimici		HULK+* (100 ml/hl)				
CRITTOGAME	Peronospora, Batteriosi				MICROSAP Cu PLUS (4 L/ha)		
	Oidio, Eriofide rugginoso				WANAX 800 SC (2 L/ha)		
	Malattie fungine		BLOKKER* (0,6-1,2 kg/ha)		BLOKKER* (0,6-1,2 kg/ha)		
	XEDAVIR (2,5 kg/ha)	XEDAVIR/TA44* (2,5kg/ha)				Marciumi Radicali	
						Sclerotinia, Botrytis, Batteriosi	
	IF23* (10 kg/ha)	IF23* (5 kg/ha)				Fusariosi	
BIOSTIMOLAZIONE	TA44 (2,5 kg/ha)						
			MEGASTYM (3-5 L/ha)				

I prodotti indicati con * non sono agrofarmaci ma prodotti ad azione specifica che rendono sfavorevoli le condizioni di sviluppo di stress biotici e abiotici, incrementando la tolleranza della pianta ad essi

CEREALI E OLEAGINOSE



MICROSAP Cu PLUS

Fungicida a basso tenore di rame (5%) con innovativo carrier brevettato.

APPLICAZIONE:

Fogliare, max 3 applicazioni.

DOSAGGIO:

6 L/ha



WANAX 800 SC

Fungicida a base di zolfo in sospensione concentrata ad alta adesività. Non richiede zone buffer.

APPLICAZIONE:

Fogliare, max 6 applicazioni ad intervallo di 10 giorni

DOSAGGIO:

2 L/ha



BTK32WG

Bioinsetticida a base di **Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki** per il controllo delle larve di Lepidotteri

APPLICAZIONE:

Fogliare, 1-3 applicazioni per generazione

DOSAGGIO:

1 L/ha



Prodotto	Descrizione
BIOVIS	Insetticida naturale a base di piretrine naturali
TA44 WG*	Prodotto specifico a base di micorrize e microrganismi antagonisti (Trichoderma asperellum TV1 e Batteri della rizosfera)
IF23 WG*	Prodotto microbico a base di Fusarium oxysporium ipovirulento IF23 che tramite induzione di resistenza conferisce maggior tolleranza alle fusariosi
METAX WG*	Prodotto microbico ad azione specifica a base di Metharhizium anisopliae in grado di aumentare la tolleranza della pianta nel confronto delle larve di coleotteri curculionidi, elateridi, lepidotteri e ditteri. Azione Biostimolante.
XEDAROS*	Concime organo-minerale a base di estratti vegetali con innovativo carrier minerale.
XEDOIL*	Prodotto a base di olio di Neem , usato storicamente come rimedio naturale.
BLOKKER*	Prodotto a base di estratti vegetali, tannini ed elicitori vegetali .

I prodotti indicati con * non sono agrofarmaci ma prodotti ad azione specifica che rendono sfavorevoli le condizioni di sviluppo di stress biotici e abiotici, incrementando la tolleranza della pianta ad essi



HULK+

Prodotto a base di un polimero silconico. Agisce contro un'ampia gamma di insetti (afidi, aleurodidi, tripidi, acari, psille, cocciniglie e cimici) con un'azione fisico-meccanica

APPLICAZIONE:

2-3 applicazioni ogni 7-10 giorni

DOSAGGIO:

100 ml/hl



MEGASTYM

Biostimolante 100% vegetale con microelementi chelati. Composto da aminoacidi vegetali a basso peso molecolare di facile assimilazione

APPLICAZIONE:

Fogliare, 2-4 applicazioni da pre-fioritura

DOSAGGIO:

3-5 L/ha



CEREALI E OLEAGINOSE

STRATEGIA DI APPLICAZIONE MICROGRANULARI

TA44 WG

Pre-Semina

Semina

Formazione
Germogli

Fioritura

...

TA44 WG*
(10 kg/ha)

TA44 WG*
(2,5 kg/ha)

Incorporato al terreno

IF23 WG

Pre-Semina

Semina

Formazione
Germogli

Fioritura

...

IF23 WG*
(10 kg/ha)

IF23 WG*
(2 kg/ha)

Incorporato al terreno

METAX WG

Pre-Semina

Semina

Formazione
Germogli

Fioritura

...

METAX WG*
(10 kg/ha)

METAX WG*
(5 L/ha)

Incorporato al terreno

STRATEGIA DI CONCIA SEMENTI

Conciare le sementi con:

TA44*

Applicare al seme 500 g per 100 kg di semente utilizzando un adeguato volume di soluzione per trattare la semente

Concia specifica contro fusariosi:

IF23*

Applicare al seme 500 g per 100 kg di semente utilizzando un adeguato volume di soluzione per trattare la semente

CEREALI E OLEAGINOSE

STRATEGIA APPLICAZIONI FOGLIARI

Fioritura

Sviluppo Frutti

Maturazione

Raccolta



HULK+* (100 ml/ha)

Applicare alla presenza dell'insetto bersaglio. Non ha tempi di carenza. Il N. di applicazioni e l'intervallo di applicazione varia in base allo stadio di sviluppo dei patogeni e alle condizioni ambientali

XEDAROS* (6-8 L/ha)

3 applicazioni a distanza di 7 giorni. NON ha azione ABBATTENTE. Applicare preventivamente o all'inizio dell'infestazione

XEDOIL* (3-5 L/ha)

Applicare ad intervalli di 7-10 giorni. Il N. di applicazioni varia in base allo stadio di sviluppo dei patogeni e alle condizioni ambientali.

BLOKKER* (0,6-1,2 L/ha)

Applicare da solo o in miscela alla comparsa dei primi sintomi di infezione fungina. Ripetere ad intervalli di 7-10 giorni. Il N. di applicazioni varia in base allo stadio di sviluppo dei patogeni e alle condizioni ambientali. Si consiglia di effettuare tra 3 e 7 applicazioni

I prodotti possono essere applicati in azione combinata