

STRATEGIA FOGLIARE RADICALE

AVVERSITÀ O PROBLEMATICHE	Fasi del ciclo colturale						Tipo di Applicazione
	Pre-Trapianto	Trapianto	Formazione Germogli	Fioritura	Sviluppo Frutti	Maturazione	
FITOFAGI	Nottue		BTK 32 WG (1 kg/ha)				
	Afidi		BIOVIS (160 ml/hl) + OLIO DI SOIA (200 ml/hl)				
	Insetti Terricoli		METAX* (3 L/ha)				
	Mosca Bianca, Afidi, Tripidi, Acari		XEDAROS* (0,6 - 1 L/hl)				
	Afidi, Aleurodidi, Dorifora, Minatori, Nottue, Tripidi		XEDOIL* (3 L/ha)				
	Afidi, Aleurodidi, Acari, Tripidi, Cimici		HULK+* (100 ml/hl)				
CRITTOGAME	Peronospora, Batteriosi				MICROSAP Cu PLUS (4 kg/ha)		
	Malattie fungine		BLOKKER* (0,6-1,2 kg/ha)		BLOKKER* (0,6-1,2 kg/ha)		
	XEDAVIR (2,5 kg/ha)	XEDAVIR/TA44* (2,5kg/ha)				Marciumi Radicali	
			SANDEK GOLD* (1,5-2 kg/ha)			Sclerotinia, Botrytis, Batteriosi	
INFESTANTI	PREMIUM GREEN (10 L/hl)						
NEMATODI	ABT PLUS MICROGRANULO* (20 kg/ha)		ABT PLUS* (3-5 L/1000mq)				
CARENZA DI Ca					XEDALIG-Ca (2 kg/ha)		
BIOSTIMOLAZIONE	TA44 (2,5 kg/ha)	TA44 (2,5 kg/ha)		SANDEK GOLD* (3-5 kg/ha)			
			MEGASTYM (3-5 L/ha)				





XEDAVIR
Biofungicida a base del fungo *Trichoderma asperellum TV1* per il controllo dei marciumi radicali
APPLICAZIONE:
Radicale, 2 applicazioni ad intervallo di 15 giorni
DOSAGGIO:
5 kg/ha





BIOVIS
Insetticida naturale a base di **piretrine naturali**
APPLICAZIONE:
Fogliare, 3 applicazioni ad intervalli di 7 giorni
DOSAGGIO:
160 ml/hl

Prodotto	Descrizione
BTK32WG	Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki controllo delle larve di Lepidotteri
PREMIUM GREEN	Erbicida di contatto a base di acido pelargonico (dose 10% in base al volume d'acqua. Ottimale in 300-500l/ha di acqua)
MICROSAP Cu PLUS	Fungicida a basso tenore di rame con estratti naturali ed un innovativo carrier minerale come veicolante.
ABT PLUS*	Concime a base di Zn ed estratti vegetali che rinforzano l'apparato radicale rendendolo tollerante ad attacchi da parte dei parassiti tellurici
TA44*	Prodotto specifico a base di micorrize e microrganismi antagonisti (Trichoderma asperellum TV1 e Batteri della rizosfera)
METAX*	Prodotto microbico ad azione specifica a base di Metharhizium anisopliae in grado di aumentare la tolleranza della pianta nel confronto delle larve di coleotteri curculionidi, elateridi, lepidotteri e ditteri. Azione Biostimolante.
SANDEK GOLD*	Formulato specifico a base di Bacillacee (<i>B. subtilis</i> , <i>B. amyloliquefaciens</i> e <i>B. megaterium</i>) ad alta concentrazione. Elevata capacità stimolante.
XEDAROS*	Concime organo-minerale a base di estratti vegetali con innovativo carrier minerale.
XEDOIL*	Prodotto a base di olio di Neem , usato storicamente come rimedio naturale
BLOKKER*	Prodotto a base di estratti vegetali , tannini ed elicitori vegetali .
XEDALIG-Ca	Concime fogliare a base di Calcio formulato con acido lignosolfonico. Utile per le fitopatie

I prodotti indicati con * non sono agrofarmaci ma prodotti ad azione specifica che rendono sfavorevoli le condizioni di sviluppo di stress biotici e abiotici, incrementando la tolleranza della pianta ad essi





HULK+
Prodotto a base di un polimero siliconico. Agisce contro un'ampia gamma di insetti (afidi, aleurodidi, tripidi, acari, psille, cocciniglie e cimici) con un'azione fisico-meccanica
APPLICAZIONE:
2-3 applicazioni ogni 7-10 giorni
DOSAGGIO:
100 ml/hl






MEGASTYM
Biostimolante 100% vegetale con microelementi chelati. Composto da aminoacidi vegetali a basso peso molecolare di facile assimilazione
APPLICAZIONE:
Fogliare, 2-4 applicazioni da pre-fioritura
DOSAGGIO:
3-5 L/ha

STRATEGIA DI APPLICAZIONE IN FERTIRRIGAZIONE




STRATEGIA DI APPLICAZIONE MICROGRANULARI


TA44 WG




IF23 WG



METAX WG




STRATEGIA DI ASSOLCATURA E SEMINA DIRETTA CON MICROGRANULARI



Semina Diretta

Applicare alla semina i prodotti alle dosi indicate (insieme o singolarmente)



STRATEGIA APPLICAZIONI FOGLIARI

Fioritura

Sviluppo Frutti

Maturazione

Raccolta

**HULK+* (100 ml/ha)**

Applicare alla presenza dell'insetto bersaglio. Non ha tempi di carenza. Il N. di applicazioni e l'intervallo di applicazione varia in base allo stadio di sviluppo dei patogeni e alle condizioni ambientali

XEDAROS* (6-8 L/ha)

3 applicazioni a distanza di 7 giorni. NON ha azione ABBATTENTE. Applicare preventivamente o all'inizio dell'infestazione

XEDOIL* (3-5 L/ha)

Applicare ad intervalli di 7-10 giorni. Il N. di applicazioni varia in base allo stadio di sviluppo dei patogeni e alle condizioni ambientali.

SANDEK GOLD* (1,5 L/ha)

Ripetere le applicazioni ad intervalli di 7 giorni. Il N. di applicazioni varia in base allo stadio di sviluppo dei patogeni

BLOKKER* (0,6-1,2 L/ha)

Applicare da solo o in miscela alla comparsa dei primi sintomi di infezione fungina. Ripetere ad intervalli di 7-10 giorni. Il N. di applicazioni varia in base allo stadio di sviluppo dei patogeni e alle condizioni ambientali. Si consiglia di effettuare tra 3 e 7 applicazioni

I prodotti possono essere applicati in azione combinata

STRATEGIA NEMATODI

Pre- Trapianto	Trapianto	Formazione Germogli	...	Raccolta
ABT PLUS MICROGRANULO* (20 kg/ha)		ABT PLUS* (30 L/ha)		
Incorporare al terreno in pre-semina o applicare al trapianto		Applicare nella seconda fase del turno di fertirrigazione. Ripetere ad intervalli di 14 giorni per un massimo di 5 applicazioni		

APPLICAZIONI PARTICOLARI

ABT PLUS*

Effetto di repellenza contro elateridi e azione stimolante sull'apparato radicale grazie allo zinco.

XEDAROS*

Effetto repellenza su dorifora e forficule.
Azione collaterale fungicida.