

STRATEGIA FOGLIARE RADICALE

AVVERSITÀ O PROBLEMATICITÀ	Fasi del ciclo colturale					Tipo di Applica- zione
	Dormienza	Germogliamento	Fioritura	Sviluppo Frutti	Maturazione	
FITOFAGI	Lepidotteri, Tignola, Tignoletta	BTK 32 WG (1 kg/ha)				
	Tignola, Tignoletta, Cicaline, Drosophila, Cimice asiatica	BIOVIS (160 ml/hl) + OLIO DI SOIA (200 ml/hl)				
	Insetti Terricoli	METAX* (3 L/ha)				
	Lepidotteri, Tignola, Tignoletta, Cocciniglie, Mosca	XEDAROS* (0,6 - 1 L/hl)				
	Lepidotteri, Tignola, Tignoletta, Cocciniglie	XEDOIL* (3 L/ha)				
	Cocciniglie, Acari, Afidi	HULK+* (100 ml/hl)				
CRITTOGAME	MICROSAP Cu PLUS (5 kg/ha)	Peronospora, Black rot		MICROSAP Cu PLUS (5 kg/ha)		
	Oidio				WANAX 800 SC (4 L/ha)	
	Malattie fungine	BLOKKER* (0,6-1,2 kg/ha)	BLOKKER* (0,6-1,2 kg/ha)			
	Botrite	CAMYLLO* (2kg /ha) + PROPOLI (1 L/ha)				
	Botrite, Oidio, Batteriosi	SANDEK GOLD* (1,5 kg/ha)				
INFESTANTI	PREMIUM GREEN (10 L/hl)					
CARENZA DI Ca				XEDALIG-Ca (2 kg/ha)		
COLPI DI SOLE				XEDASUN (10 L/ha)		
BIOSTIMOLAZIONE	TA44 (2,5 kg/ha)	SANDEK GOLD* (3-5 kg/ha)				
	MEGASTYM (3-5 L/ha)					

I prodotti indicati con * non sono agrofarmaci ma prodotti ad azione specifica che rendono sfavorevoli le condizioni di sviluppo di stress biotici e abiotici, incrementando la tolleranza della pianta ad essi



WANAX 800 SC

Fungicida a base di zolfo in sospensione concentrata ad alta adesività. Non richiede zone buffer.

APPLICAZIONE:

Fogliare, max 6 applicazioni ad intervallo di 10 giorni

DOSAGGIO:

2 L/ha



MICROSAP CU PLUS

Fungicida rameico a basso tenore di rame (5%) veicolato con un trasportatore minerale brevettato

APPLICAZIONE:

Fogliare, applicazioni ad intervallo di 7 giorni

DOSAGGIO:

5 L/ha



BIOVIS

Bioinsetticida a base di piretrine naturali

APPLICAZIONE:

Fogliare, applicazioni ad intervallo di 7 giorni

DOSAGGIO:

160 ml/hl



Prodotto	Descrizione
BTK32WG	Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki controllo delle larve di Lepidotteri
PREMIUM GREEN	Erbicida di contatto a base di acido pelargonico (dose 10% in base al volume d'acqua. Ottimale in 300-500l/ha di acqua)
TA44*	Prodotto specifico a base di micorrize e microrganismi antagonisti (Trichoderma asperellum TV1 e Batteri della rizosfera)
METAX*	Prodotto microbico ad azione specifica a base di Metharhizium anisopliae in grado di aumentare la tolleranza della pianta nel confronto delle larve di coleotteri curculionidi, elateridi, lepidotteri e ditteri. Azione Biostimolante.
CAMYLLO*	Formulato specifico a base di Bacillacee (<i>B. amyloliquefaciens</i> e <i>B. lentus</i>) dalle elevate capacità stimolanti
SANDEK GOLD*	Formulato specifico a base di Bacillacee (<i>B. subtilis</i> , <i>B. amyloliquefaciens</i> e <i>B. megaterium</i>) ad alta concentrazione. Elevata capacità stimolante.
XEDAROS*	Concime organo-minerale a base di estratti vegetali con innovativo carrier minerale.
XEDOIL*	Prodotto a base di olio di Neem , usato storicamente come rimedio naturale
BLOKKER*	Prodotto a base di estratti vegetali, tannini ed elicitori vegetali .
XEDASUN	Prodotto a base di Calcio che crea un film protettivo contro le scottature
XEDALIG-Ca	Concime fogliare a base di Calcio formulato con acido lignosolfonico . Utile per le fitopatie

I prodotti indicati con * non sono agrofarmaci ma prodotti ad azione specifica che rendono sfavorevoli le condizioni di sviluppo di stress biotici e abiotici, incrementando la tolleranza della pianta ad essi



HULK+

Prodotto a base di un polimero siliconico. Agisce contro un'ampia gamma di insetti (afidi, aleurodidi, tripidi, acari, psille, cocciniglie e cimici) con un'azione fisico-meccanica

APPLICAZIONE:

2-3 applicazioni ogni 7-10 giorni

DOSAGGIO:

100 ml/hl



MEGASTYM

Biostimolante 100% vegetale con microelementi chelati. Composto da aminoacidi vegetali a basso peso molecolare di facile assimilazione

APPLICAZIONE:

Fogliare, 2-4 applicazioni da pre-fioritura

DOSAGGIO:

3-5 L/ha




MICROORGANISMI IN FERTIRRIGAZIONE

Schema di Impiego

30% ACQUA	50% MICROORGANISMI	20% ACQUA
-----------	--------------------	-----------

STRATEGIA STANCHEZZA TERRENO



- Prima dell'applicazione bagnare bene il terreno per favorire la penetrazione dei microrganismi nel terreno
- Strategia pluriennale. Da replicare per diversi anni alla ripresa vegetativa
- Ideale l'abbinamento in applicazione con il KING o il MEGASTYM per fornire un substrato iniziale ottimale ai microrganismi e migliorarne la colonizzazione

STRATEGIA NUOVI IMPIANTI

Applicare nelle buche o nei solchi di trapianto i seguenti prodotti utilizzando una sospensione acquosa

XEDAGREEN (5 kg/ha)	Creare la relazione simbiotica con le micorrize
TA44* (2,5 kg/ha)	Rendere il substrato soppressivo nei confronti di altri funghi

- Ripetere il trattamento a distanza di 10 giorni tramite soluzione acquosa
- Ideale l'abbinamento in applicazione con il KING o il MEGASTYM per fornire un substrato iniziale ottimale ai microrganismi e migliorarne la colonizzazione

STRATEGIA APPLICAZIONI FOGLIARI

Fioritura

Sviluppo Frutti

Maturazione

Raccolta



HULK+* (100 ml/hl)

Applicare alla presenza dell'insetto bersaglio. Non ha tempi di carenza. Il N. di applicazioni e l'intervallo di applicazione varia in base allo stadio di sviluppo dei patogeni e alle condizioni ambientali

XEDAROS* (6-8 L/ha)

3 applicazioni a distanza di 7 giorni. NON ha azione ABBATTENTE. Applicare preventivamente o all'inizio dell'infestazione

XEDOIL* (3-5 L/ha)

Applicare ad intervalli di 7-10 giorni. Il N. di applicazioni varia in base allo stadio di sviluppo dei patogeni e alle condizioni ambientali.

SANDEK GOLD* (1,5 L/ha)

Ripetere le applicazioni ad intervalli di 7 giorni. Il N. di applicazioni varia in base allo stadio di sviluppo dei patogeni

BLOKKER* (0,6-1,2 L/ha)

Applicare da solo o in miscela alla comparsa dei primi sintomi di infezione fungina. Ripetere ad intervalli di 7-10 giorni. Il N. di applicazioni varia in base allo stadio di sviluppo dei patogeni e alle condizioni ambientali. Si consiglia di effettuare tra 3 e 7 applicazioni

I prodotti possono essere applicati in azione combinata