

BIOX-M

Trattamento antigerminativo delle patate per termonebulizzazione
SOLUZIONE TERMONEBULIZZABILE (HN)

BIOX-M – 100 grammi di prodotto contengono:

- Olio di menta 100 %



PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO

(H304) Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie; (H317) Può provocare una reazione allergica della pelle; (H400) Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA

(P261) Evitare di respirare i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol; (P273) Non disperdere nell'ambiente; (P280) indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso; (P301 + P310) IN CASO D'INGESTIONE : contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico; (P331) NON provocare il vomito; (P333 + P313) In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico; (P501) Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

INDICAZIONI SUPPLEMENTARI

(EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Titolare della registrazione:

XEDA INTERNATIONAL S.A.

Z.A. La Crau - F- 13670 Saint Andiol – France

Tel.: +(33)-490902323

Stabilimento di produzione:

Xeda International S.A.

Z.A. La Crau

F-13670 Saint Andiol (Francia)

Distribuito da:

Xeda Italia Srl, Via Filippo Guarini 15 – 47121 Forlì (FC)

Autorizzazione Ministero della Salute

n. 14853 del 23/12/2025

Taglie: 5 – 20 Kg

Partita n.:

Indossare guanti resistenti agli agenti chimici, indumenti di protezione e occhiali di protezione, durante la fase di caricamento del dispositivo e miscelazione del prodotto, durante il lavaggio e la manutenzione delle celle. Indossare guanti resistenti agli agenti chimici, indumenti di protezione, occhiali di protezione e maschera per vapori organici qualora sia necessario rientrare nella cella prima delle 24 ore successive al trattamento. La cella deve essere ventilata per 2 ore immediatamente dopo la fine del trattamento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleli.

MODALITÀ DI IMPIEGO

BIOX-M deve essere applicato esclusivamente per termonebulizzazione con l'Electrofog Xeda o XEDAVAP conformandosi alla scheda tecnica del prodotto. I trattamenti vengono eseguiti da personale tecnico specializzato. Prodotto ammesso nel trattamento antigerminativo della patata in post-raccolta.

Dosi d'impiego: I limiti massimi sono di 360 mL/tonnellata di patate per tutta la durata dello stoccaggio.

Per il trattamento per termonebulizzazione con l'Electrofog: in funzione della dimensione dei germogli e dell'intervallo fra le applicazioni è possibile utilizzare il prodotto alla dose di 30-90 mL/tonnellata per trattamento.

Sono ammessi al massimo 11 trattamenti a stagione, previsti tra la raccolta estiva, la conservazione e l'immissione in commercio nella primavera successiva. Per ottenere un buon risultato di inibizione della germogliatura delle patate si consiglia un trattamento ogni 3-8 settimane.

Per il trattamento con XEDAVAP, evaporazione a freddo, applicare in continuo da 1 a 2 mL/tonnellata/giorno.

Intervallo di sicurezza: 3 giorni dal trattamento.

Avvertenza: prima del trattamento assicurarsi dell'assenza di umidità sui tuberi come indicato sulla scheda tecnica. Il trattamento viene effettuato in ambiente chiuso sulle patate raccolte.

COMPATIBILITÀ: BIOX-M è perfettamente compatibile con la gamma aerosol Xeda.

CONSERVAZIONE: BIOX-M è stabile per 3 anni se conservato ad una temperatura compresa tra 5 e 40°C.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle persone ed agli animali; non applicare con i mezzi aerei; per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n° 65/2003); operare in assenza di vento; da non vendersi sfuso; il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; il contenitore non può essere riutilizzato.

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Precauzioni d'impiego: Non ingerire. Non respirare le particelle nebulizzate. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua.