SANDEK PLUS

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

Inoculo di funghi micorrizici - Formulazione liquida

XEDA Italia s.r.l.
agribusiness

AGITARE PRIMA DELL'USO

Peso netto: **Kg 1**

SANDEK PLUS

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Inoculo di funghi micorrizici - Formulazione liquida

COMPOSIZIONE

Tipo di ammendante organico: ammendante semplice non compostato
Contenuto in micorrize…….....1%
Contenuto in batteri della rizosfera (*Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, Bacillus pumilus*)….....1 x 10^9 UFC/g

Non contiene organismi geneticamente modificati e organismi patogeni (salmonella, coliformi fecali, mesofili aerobici e uova di nematodi)

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: inoculo di funghi endomicorrizici, batteri autorizzati ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 1.9.6, del regolamento (UE) 2018/848, ammendante prodotto senza legname trattato chimicamente dopo l'abbattimento, radici di sorgo.

Peso netto: 1 Kg **Lotto N°**

Fabbricante: XEDA ITALIA S.r.l.
Via F. Guarini, 15 - 47121 Forlì (FC) - Tel. 0543 780600

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102: Tenere fuori della portata dei bambini. P262: Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere occhi/viso.

CARATTERISTICHE

SANDEK PLUS è un formulato specifico per applicazioni radicali costituito da micorrize e microrganismi antagonisti con elevate proprietà benefiche. Le micorrize aumentano la crescita e sviluppo radicale incrementando l'assorbimento di nutrienti minerali come azoto, potassio e magnesio e specialmente di quelli a lenta diffusione nel suolo (fosfati solubili, zinco, boro); non meno importante è l'aumento della resistenza allo stress idrico e alla salinità. *Bacillus subtilis, B. megaterium e B. pumilus* influenzano l'accrescimento vegetativo e radicale e la produttività della pianta attraverso: inibizione dell'attività di microrganismi deleteri nella rizosfera, aumento della disponibilità e relativo assorbimento di nutrienti, aumento dell'efficienza dell'apporto e dell'utilizzo di azoto, diminuzione e inattivazione di composti tossici o inibitori per lo sviluppo radicale, produzione di enzimi, vitamine, fattori di crescita e ormoni naturali. Tutto questo permette a SANDEK PLUS di favorire condizioni di maggior sanità della rizosfera a discapito di sostanze inibitorie per le piante e microrganismi patogeni che attaccano l'apparato radicale o il colletto delle piante quali *Pythium* spp., *Fusarium* spp., *Botrytis* spp., *Sclerotinia* spp., *Rizoctonia* spp. e *Verticillium* spp, La presenza di più specie di *Bacillus* garantisce una rapidità d'azione e una maggiore solubilità e adattabilità a differenti impianti di distribuzione.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Colture: orticole, arboree, vite da vino e da tavola, olivo e floricole.

APPLICAZIONE	DOSE	MODALITÀ
Al terreno	200-300 g / 1000 m^2 2-3 Kg/ha	eseguire un primo trattamento subito prima della semina o trapianto e proseguire con trattamenti alla medesima dose ogni 2 settimane sino a quando l'apparato radicale non ha raggiunto lo sviluppo ottimale e si sono formati i palchi o abbozzi fiorali.
In vaso e altri contenitori	100 g / 100 litri di acqua	bagnare uniformemente il terreno distribuendo la soluzione al momento dell'invaso e continuare l'applicazione ogni due settimane sino alla completa radicazione delle piante
Idroponica e fuori suolo	100 g / 100 litri di acqua	per il primo riempimento dell'impianto, prima di ogni ciclo di coltivazione
	50 g /100 litri di soluzione circolante	sino a completo sviluppo delle piante in occasione dei rabbocchi, integrando l'acqua di rabbocco oppure somministrandolo ad intervalli di circa due settimane
Fogliare	200-300 g / 100 litri di acqua	In considerazione dell'andamento climatico e della durata della coltura, prevedere più applicazioni

In considerazione dell'andamento climatico e della durata della coltura si consiglia di ripetere il trattamento alla dose inferiore per migliorare l'azione colonizzante ottenuta con la prima somministrazione.

AVVERTENZE

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare ad una temperatura compresa tra 4°C e 30°C. Il prodotto non è combustibile.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

FLACONE HDPE2 **TAPPO** PP5 PLASTICA. Verifica le disposizioni del tuo Comune.

SANDEK PLUS

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

Inoculo di funghi micorrizici - Formulazione liquida

XEDA Italia s.r.l.
agribusiness

AGITARE PRIMA DELL'USO

Peso netto: **Kg 5**

SANDEK PLUS

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Inoculo di funghi micorrizici - Formulazione liquida

COMPOSIZIONE

Tipo di ammendante organico: ammendante semplice non compostato
Contenuto in micorrize…….....1%
Contenuto in batteri della rizosfera (*Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, Bacillus pumilus*)….....1 x 10^9 UFC/g

Non contiene organismi geneticamente modificati e organismi patogeni (salmonella, coliformi fecali, mesofili aerobici e uova di nematodi)

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: inoculo di funghi endomicorrizici, batteri autorizzati ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 1.9.6, del regolamento (UE) 2018/848, ammendante prodotto senza legname trattato chimicamente dopo l'abbattimento, radici di sorgo.

Peso netto: 5 Kg **Lotto N°**

Fabbricante: XEDA ITALIA S.r.l.
Via F. Guarini, 15 - 47121 Forlì (FC) - Tel. 0543 780600

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102: Tenere fuori della portata dei bambini. P262: Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere occhi/viso.

CARATTERISTICHE

SANDEK PLUS è un formulato specifico per applicazioni radicali costituito da micorrize e microrganismi antagonisti con elevate proprietà benefiche. Le micorrize aumentano la crescita e sviluppo radicale incrementando l'assorbimento di nutrienti minerali come azoto, potassio e magnesio e specialmente di quelli a lenta diffusione nel suolo (fosfati solubili, zinco, boro); non meno importante è l'aumento della resistenza allo stress idrico e alla salinità. *Bacillus subtilis, B. megaterium e B. pumilus* influenzano l'accrescimento vegetativo e radicale e la produttività della pianta attraverso: inibizione dell'attività di microrganismi deleteri nella rizosfera, aumento della disponibilità e relativo assorbimento di nutrienti, aumento dell'efficienza dell'apporto e dell'utilizzo di azoto, diminuzione e inattivazione di composti tossici o inibitori per lo sviluppo radicale, produzione di enzimi, vitamine, fattori di crescita e ormoni naturali. Tutto questo permette a SANDEK PLUS di favorire condizioni di maggior sanità della rizosfera a discapito di sostanze inibitorie per le piante e microrganismi patogeni che attaccano l'apparato radicale o il colletto delle piante quali *Pythium* spp., *Fusarium* spp., *Botrytis* spp., *Sclerotinia* spp., *Rizoctonia* spp. e *Verticillium* spp, La presenza di più specie di *Bacillus* garantisce una rapidità d'azione e una maggiore solubilità e adattabilità a differenti impianti di distribuzione.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Colture: orticole, arboree, vite da vino e da tavola, olivo e floricole.

APPLICAZIONE	DOSE	MODALITÀ
Al terreno	200-300 g / 1000 m^2 2-3 Kg/ha	eseguire un primo trattamento subito prima della semina o trapianto e proseguire con trattamenti alla medesima dose ogni 2 settimane sino a quando l'apparato radicale non ha raggiunto lo sviluppo ottimale e si sono formati i palchi o abbozzi fiorali.
In vaso e altri contenitori	100 g / 100 litri di acqua	bagnare uniformemente il terreno distribuendo la soluzione al momento dell'invaso e continuare l'applicazione ogni due settimane sino alla completa radicazione delle piante
Idroponica e fuori suolo	100 g / 100 litri di acqua	per il primo riempimento dell'impianto, prima di ogni ciclo di coltivazione
	50 g /100 litri di soluzione circolante	sino a completo sviluppo delle piante in occasione dei rabbocchi, integrando l'acqua di rabbocco oppure somministrandolo ad intervalli di circa due settimane
Fogliare	200-300 g / 100 litri di acqua	In considerazione dell'andamento climatico e della durata della coltura, prevedere più applicazioni

In considerazione dell'andamento climatico e della durata della coltura si consiglia di ripetere il trattamento alla dose inferiore per migliorare l'azione colonizzante ottenuta con la prima somministrazione.

AVVERTENZE

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare ad una temperatura compresa tra 4°C e 30°C. Il prodotto non è combustibile.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

TANICA HDPE2 **TAPPO** PP5 PLASTICA. Verifica le disposizioni del tuo Comune